

INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas La Libertad - Trujillo (51) 932219044 / (51) 979232073 brivet@brivetperu.com brivetperu.com



Cipionato de Estradiol Synkro Xy

Principio activo

Cipionato de Estradiol 0,5 mg.

Laboratorio

SYNKRO XY

Categoria

HORMONAL

Indicaciones

El Cipionato de estradiol es un agente hormonal estrogénico indicado para el manejo reproductivo del bovino. Es utilizado como complemento en la inducción y sincronización de celos con progestágenos, con prostaglandinas y GnRH o como complemento en el tratamiento del anestro posparto en bovinos.



Especies indicadas

Bovinos.

Dosificacion y vias de administracion:

Dosificación:

Se aplicará una dosis de 1 ml por animal (corresponde a administrar 0.5 mg de cipionato de estradiol por animal) de acuerdo a los siguientes esquemas:

•TRATAMIENTO CON PROGESTÁGENOS

Opción Nº 1

Sincronización de Celo:

Día 0: Insertar Dispositivo Intravaginal Procrear Synkro Xy + 2 ml Benzoato de Estradiol Synkro Xy.

Día 8: Retiro Dispositivo + 2 ml Prostaglandina (D+Cloprostenol Sódico Synkro Xy) + 1 ml Cipionato de Estradiol Synkro Xy.

IATF: 52-56 hs posteriores al retiro del dispositivo.

Opción Nº 2

Anestro pos parto:

Día 0: Insertar Dispositivo Intravaginal Procrear Synkro Xy + 2 ml Benzoato de Estradiol Synkro Xy.

Día 8: Retiro Dispositivo + 2 ml Prostaglandina (D+C Sódico Synkro Xy) +1 ml Cipionato de Estradiol Synkro

Xy + 400 UI Gonadotrofina Coriónica equina (eCG).

IATF: 52-56 hs posteriores al retiro del dispositivo.

•TRATAMIENTO CON PROSTAGLANDINAS Y GNRH

Opción Nº3



INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas La Libertad - Trujillo (51) 932219044 / (51) 979232073 brivet@brivetperu.com brivetperu.com



Sincronización de celo con Programa HeatSynch:

Día 0: 5ml Análogo sintético GnRH: Acetato de Buserelina Synkro Xy.

Día 7: 2 ml Cloprostenol Sódico Prostaglandina (D+Cloprostenol Sódico Synkro Xy).

Día 8: 1 ml Cipionato de Estradiol Synkro Xy.

Día 10: IATF.

Vías de administración:

El producto se aplica por vía parenteral intramuscular.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No utilizar en animales prepúberes. No utilizar en hembras preñadas.

Presentación

Envases conteniendo 50 ml.