

Dermil INYECTABLE

Principio activo

Triamcinolona acetona 0.6 g.

Laboratorio

AFFORD

Categoría

ANTIISTAMÍNICO

Descripción

Antiinflamatorio - Antialérgico

Glucocorticoide de depósito

Suspensión acuosa estéril

Para el tratamiento de alergias, urticarias y dermatitis

Una sola aplicación, para todo un tratamiento



Indicaciones

Afecciones cutánea como alergia, dermatitis, pruritos, eczemas, urticaria. Enfermedades respiratorias de origen alérgico.

Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis, bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome reumatoideo y otras enfermedades que requieran tratamiento con glucocorticoides.

Dosificación y vías de administración:

Dosificación:

Caninos: Vía IM o SC: 0,1 a 0,2 mg./Kg. (0.33 mL. cada 10 kg.).

Felinos: Vía IM o SC 0,1 a 0,2 mg./kg. (0,15 mL. por animal).

Infiltraciones: Caninos y felinos 1,2 a 1,8 mg. (0,2 a 0,3 mL.)

Vías de administración:

Intramuscular, subcutánea, intraarticular, intrasínovial.

Presentación

Envase conteniendo 3 frascos ampolla de 10 ml. c/u