

INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas La Libertad - Trujillo (51) 932219044 / (51) 979232073 brivet@brivetperu.com brivetperu.com



Megluxin

Principio activo

Flunixin (como sal de meglumina) 5 g

Laboratorio

PROAGRO

Categoria

ANTIINFLAMATORIO

Descripción

Solución inyectable lista para usar, que posee como principio activo Meglumina de Flunixin, droga con potente actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética, perteneciente al grupo de los antiinflamatorios no esteroides (AINES).



Indicaciones

Bovinos: Tratamiento soporte en infecciones agudas, particularmente en el complejo respiratorio bovino. Tratamiento del dolor agudo causado por cirugías, heridas, lesiones del aparato locomotor, miositis, osteitis, artritis, tendinitis, sinovitis.

Porcinos: Tratamiento del síndrome metritis - mastitis - agalactia. Inflamaciones agudas y crónicas del aparato locomotor.

Equinos: Alivio de lesiones inflamatorias del aparato locomotor, miositis, osteítis, artritis, tendinitis, sinovitis. Alivio del dolor visceral asociado a la presencia de cólicos.

Caninos: Alivio en lesiones inflamatorias del aparato locomotor, miositis, osteítis, artritis, tendinitis, sinovitis. Cuadros de dolor agudo.

Especies indicadas

Bovinos, porcinos, equinos y caninos.

Dosificacion y vias de administracion:

Dosificación:

Bovinos: en todas las indicaciones: 2,2mg/k.p.v. Repetir si es necesario a intervalos de 24 horas, pero no más de 5 días. Si se administra por vía endovenosa, no debe superar los 3 días. Diarreas neonatales: 2 a 3 ml por ternero (dosis única).

Porcinos: en todas las indicaciones: 2, 2mg/k.p.v. repetir si es necesario a intervalos de 24 hs, pero no más de 5 días. En casos de síndrome de mastitis - metritis - agalactia (MMA) se recomienda administrar por vía intramuscular, una aplicación cada 12 horas, máximo dos aplicaciones.

Brivet

INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas La Libertad - Trujillo (51) 932219044 / (51) 979232073 brivet@brivetperu.com brivetperu.com



Equinos: en dolores viscerales asociados al cólico, se recomienda 1,1 mg /k.p.v vía intravenosa, al iniciarse la sintomatología. El tratamiento puede ser repetido 1 a 2 veces si reaparecen los síntomas. En inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas, se recomienda 1,1mg/k.p.v. vía intramuscular o intravenosa una vez al día durante no más de 5 días consecutivos.

Caninos: en inflamaciones y dolores asociados a alteraciones músculoesqueléticas, la dosis general varía entre 1,1 y 2,0 mg/k.p.v. La dosificación puede repetirse durante 3 a 5 días consecutivos, intercalados con períodos de descanso de igual duración o según indicación profesional.

Vías de administración:

Bovinos y equinos: intramuscular (IM) o endovenosa (EV)

Porcinos: intramuscular (IM).

Caninos: subcutánea (SC), intramuscular (IM) o endovenosa (EV)

Contraindicaciones y limitaciones de uso

Está contraindicado en animales que hayan presentado reacciones de hipersensibilidad a la droga.

Presentación

Frascos de 50 ml.