

PROGENIE SYNKRO XY 0.6 G.

Principio activo

Progesterona micronizada 0.6 g.
Silicona Inerte c.s.p 1 dispositivo

Laboratorio

SYNKRO XY

Categoría

HORMONAL

Descripción

Progenie es un Dispositivo Intravaginal impregnado en Progesterona, destinado para la regulación del ciclo estral en bovinos.

Indicaciones

- Control del ciclo estral de la hembra bovina (vaquillonas y vacas).
- Sincronización del celo en programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF).
- Tratamiento de anestro post parto y ovarios quísticos.
- Control de retornos al servicio mediante resincronización
- Reducción de los días del intervalo parto-concepción.

Especies indicadas

El producto se destina a la especie bovina.

Dosificación y vías de administración:

El dispositivo es de aplicación intravaginal.

Aplicación: Se recomienda sumergir el aplicador a utilizar en una solución de amonio cuaternario (Sterilón) antes de cada uso. Manipular el dispositivo mediante el uso de guantes de látex, proceder a su colocación en el aplicador ya desinfectado. Luego, con la vulva higienizada, introducir el aplicador (previa lubricación con gel obstétrico) hasta alcanzar el fondo del saco vaginal, posteriormente accionar para depositar el dispositivo en fondo de vagina y retirar el aplicador.

Extracción: Tirar suavemente del cordón que sobresale de la vulva.

Se sugiere el siguiente programa, el cual queda sujeto a modificaciones según criterio del profesional actuante:

REFERENCIAS

D: colocar dispositivo.

BE2: Benzoato de Estradiol Synkro Xy 2 ml.

BE1: Benzoato de Estradiol Synkro Xy 1 ml.



Progenie 0.6 g
Progesterona 0.6 g

 **Dispositivo intravaginal bovino**

CE: Cipionato de Estradiol Synkro Xy 1 ml.

RD: retiro del dispositivo.

PG: D(+)Cloprostenol sódico Synkro Xy 2 ml.

GnRH: Acetato de Buserelina Synkro Xy 5 ml.

IATF: inseminación artificial a tiempo fijo.

Indicación	Día 0	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10
Sincronización de celo (protocolo 1)	D + BE2	RD + PG	BE1	IATF	
Sincronización de celo (protocolo 2)	D + BE2	RD + PG + CE		IATF	
Anestro (protocolo 1)	D + BE2		RD	BE1	IATF
Anestro (protocolo 2)	D + GnRH	RD + PG	BE1	IATF	
Quistes ováricos	D	RD + PG		GnRH	IATF

RESINCRONIZACIÓN DE SERVICIOS

En el caso de querer detectar los animales que no hayan quedado preñados, se sugiere el siguiente programa tomando como día 0, el día de la inseminación.

Día 13: Insertar Progenie 0,5g.

Día 20: Retirar Progenie 0,5g.

Días 22,23 y 24: Detección de celo e inseminación artificial.

La ejecución de los tratamientos, deben ser dirigidos por estricta intervención profesional.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No aplicar en hembras con anomalías del tracto genital (endometritis, vulvovaginitis, defectos anatómicos) y en animales con hipersensibilidad al principio activo.

No utilizar en animales mal alimentados y de baja condición corporal, en los cuales puede no lograrse el efecto esperado.

Presentación

Bolsa con 10 dispositivos intravaginales.